

A kruidenrijk grasland
te ontwikkelen door het maairegime =
beheermaatregel:
gedurende de eerste 2 á 3 jaar intensief
maaïen (3x per j) en maaisel afvoeren;
tijdstip maaïen: vanaf half mei/ half
juni tot half augustus/ begin oktober.
daarna 2x per jaar maaïen en afvoeren;
tijdstip maaïen: begin juni en in augustus;
maaisel altijd eerst enkele dagen laten
liggen voor het afvoeren.

Acer campestre (veldesdoorn)	15%
Corylus avellana (hazelaar)	10%
Cornus sanguinea (rode kornoelje)	10%
Prunus padus (gewone vogelkers)	10%
Rhamnus frangula (vuilboom)	15%
Ilex aquifolia (hulst)	5%
Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)	10%
Prunus spinosa (sleedoorn)	15%
Rosa canina (hondsroos)	10%

C assortiment solitaire bomen
maat bomen minstens 12-14;
hst = hoogstam, bvd = beveerd;
aanplant duurzaam beschermen tegen
vraatschade;
2x Bep_bev (Betula pendula = ruwe berk)
1x Tic_hst (Tilia cordata = winterlinde)

landschappelijke inpassingsplan Weerijs, datum 05-02-2021, schaal 1:500/A3